

ALCOHOL

TEN EN CUENTA

LOS EFECTOS DEL ALCOHOL DEPENDEN DE MUCHOS FACTORES QUE LOS PUEDEN ACELERAR O AGRAVAR COMO SON:



EDAD

LOS JÓVENES SON MÁS SENSIBLES A LOS EFECTOS DEL ALCOHOL EN ACTIVIDADES QUE TIENEN QUE VER CON LA PLANIFICACIÓN, LA MEMORIA Y EL APRENDIZAJE, PERO SON MÁS "RESISTENTES" QUE LOS ADULTOS A LOS EFECTOS SEDANTES Y LA DESCOORDINACIÓN MOTORA.



SEXO

DEBIDO A LA DIFERENCIA EN LA CONCENTRACIÓN DE AGUA, GRASA CORPORAL Y LOS NIVELES DE DESHIDROGENASA ENTRE HOMBRES Y MUJERES, EL ALCOHOL AFECTA MÁS A LAS MUJERES.




RAPIDEZ INGESTA

A MAYOR INGESTA EN MENOR TIEMPO, MAYOR POSIBILIDAD DE INTOXICACIÓN.



COMBINACIÓN CON BEBIDAS CARBÓNICAS

AL MEZCLAR EL ALCOHOL CON TÓNICA, COLAS, ETC, SE ACELERA LA INTOXICACIÓN.



COMBINACIÓN CON OTRAS SUTANCIAS

TRANQUILIZANTES, RELAJANTES MUSCULARES O ANALGÉSICOS POTENCIAN SUS EFECTOS SEDANTES. EL CANNABIS INCREMENTA LOS EFECTOS SEDANTES. LA COCAÍNA CONTRARRESTA SUS EFECTOS PERO LA TOXICIDAD DE AMBAS SUSTANCIAS ES MAYOR.



CANTIDAD INGESTA

SEGÚN LA CANTIDAD DE ALCOHOL CONSUMIDA, LA INGESTA PUEDE CONSIDERARSE DE BAJO, ALTO RIESGO O PELIGROSO.



PESO

EL ALCOHOL AFECTA MÁS GRAVEMENTE A LAS PERSONAS CON MENOR MASA CORPORAL.



INGESTIÓN DE COMIDA

SI SE INGIEREN ALIMENTOS, EN ESPECIAL ALIMENTOS GRASOS, SE ENLENTECE LA INTOXICACIÓN, PERO NO SE EVITA NI SE REDUCEN LOS DAÑOS EN EL ORGANISMO.

EL ALCOHOL ES UN DEPRESOR DEL SISTEMA NERVIOSO



DISMINUCIÓN DE REFLEJOS.



PERTURBACIÓN GENERAL DEL COMPORTAMIENTO.



FALSA APRECIACIÓN DE DISTANCIA.



FUERTE FATIGA Y PÉRDIDA DE VISIÓN.



EUFORIA, INCREMENTO DEL TIEMPO DE REACCIÓN.



EMBRIAGUEZ NOTORIA.